



راهنمای مصرف داروهای بخش زایمان

نام دارو : سفالکسین

نام های تجاری : کفلکس-سفال-ایکس

نام دارو : سفالکسین نام های تجاری : کفلکس-سفال-ایکس	
شکل دارو	کپسول 500 میلی گرم
اثر دارو	درمان عفونت های باکتریایی
نکات آموزشی	برای اثربخشی دارو بهتر است در ساعات مشخص مصرف شود. با آب فراوان مصرف شود. در صورت درد شکم، اسهال، تهوع و استفراغ به پزشک مراجعه شود.



راهنمای مصرف داروهای بخشی زایمان

نام دارو : داکسی سایکلین	
نام های تجاری : Vibramycin	
شکل دارو	کپسول 100 میلی گرم
اثر دارو	درمان عفونت باکتریایی، پوستی، تنفسی، اسهال
نکات آموزشی	در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود. در صورت بیماری کلیه و کبد با پزشک مشورت شود. دارو را در زمان معینی مصرف نمایید با یک لیوان پر آب و به صورت کامل بلعیده و از باز کردن یا جویدن خودداری شود. پس از مصرف دارو از قرار گرفتن به صورت خوابیده خودداری شود در صورت فراموش شدن یک دوز آن دوز بعدی دو برابر نشود. در طول استفاده از این دارو از قرار گرفتن زیر نور خورشید خودداری شود. در صورت خارش و درد قفسه سینه و اسهال سریعاً به پزشک مراجعه نمایید



راهنمای مصرف داروهای بخش زایمان

نام دارو: مفنامیک اسید

نام های تجاری: Ponstel-ponstan-Mefnacin

نام دارو: مفنامیک اسید	
نام های تجاری: Ponstel-ponstan-Mefnacin	
شکل دارو	کپسول 250 میلی گرم
اثر دارو	کاهش درد خفیف تا متوسط، دردهای قاعدگی و کاهش خونریزی
نکات آموزشی	دارو باید همراه با غذا و با دو لیوان آب مصرف شود. تا ده دقیقه بعد از مصرف دارو از دراز کشیدن پرهیز شود. در صورت دل درد، اسهال، یبوست و سوزش سردل و سرگیجه با پزشک مشورت شود.



راهنمای مصرف داروهای بخش زایمان

نام دارو : سفکسیم

نام های تجاری : Hicefi-Medxef

قرص 400 و 200 میلی گرم	شکل دارو
درمان عفونت باکتریایی	اثر دارو
قرص با یک لیوان آب خورده شود. افرادی که آلرژی به آنتی بیوتیکها دارند، پزشک را مطلع کنند. در بیماران کلیوی با احتیاط مصرف شود. با داروی ادرار آور تداخل داشته و به طور همزمان مصرف نشود. در صورت سابقه حساسیت به پنی سیلین این دارو نباید مصرف شود. در صورت مشکلات گوارشی بهتر است با غذا مصرف شود. باید دقیقاً سر ساعت مشخص مصرف شود.	نکات آموزشی



راهنمای مصرف داروهای بخش زایمان

نام دارو : دیکلوفناک

نام های تجاری : DICOTARD-Voltaren-Diclomax-Volsaid-Arthrotec

	شیاف 50 و 100 میلی گرم	شکل دارو
	برای تسکین درد	اثر دارو
	ممکن است فشارخون را بالا ببرد. از عوارض احتمالی این دارو اسهال، سوزش سردل، یبوست، نفخ، سردرد، گیجی، حالت تهوع، ادرار تیره می باشد. اگر سابقه حمله آسم پس از استفاده از آسپیرین دارید، قبل از مصرف دیکلوفناک با پزشک مشورت نمایید. مصرف دارو در سه ماهه سوم بارداری ممنوع است.	نکات آموزشی



راهنمای مصرف داروهای بخش زایمان

نام دارو : متیل ارگونین	
نام های تجاری : مترژن	
قرص 0/125 میلی گرم و آمپول 0/2 میلی گرم	شکل دارو
پیشگیری و درمان خونریزی پس از سقط جنین یا زایمان	اثر دارو
در صورت فراموشی یک دوز به محض یادآوری مصرف شود. از دو برابر کردن دوز دارو در یک نوبت خودداری شود. به طور منظم و در ساعات معینی مصرف شود. قبل از زایمان و خروج جفت نباید مصرف شود. در صورت فشار خون بالا نباید مصرف شود.	نکات آموزشی



راهنمای مصرف داروهای بخش زایمان

نام دارو: انوکسپارین

نام های تجاری: ناکسپرین – Lovenox-Atorexin

<p>آمپول 4000 و 6000 میلی گرم</p>	<p>شکل دارو</p>
<p>جلوگیری از لخته شدن خون، پیشگیری از آمبولی، در زنان باردار برای خون رسانی و پیشگیری از سقط جنین</p>	<p>اثر دارو</p>
<p>در صورت مشکلات کبدی کلیوی، خونریزی فعال، فشار خون بالا، مشکلات چشمی و استفاده از آی یو دی و انجام کارهای دندانپزشکی پزشک خود را مطلع کنید. با داروهای وارفارین و کلوپیدوگرل و ضدالتهاب غیر استروئیدی تداخل دارد. عوارض جانبی شامل گیجی، تغییر بینایی، تهوع، راش پوستی، قرمزی، تورم و سوزش یا درد در محل تزریق</p>	<p>نکات آموزشی</p>



راهنمای مصرف داروهای بخشی زایمان

نام دارو : مدروکسی پروژسترون استات

نام های تجاری : Depo-provera

شیاف 200 و 400 میلی گرم	شکل دارو
پیشگیری از سقط – سندروم پیش از قاعدگی	اثر دارو
طریقه مصرف به صورت رکتال یا واژینال میباشد. در موارد فشار خون کنترل نشده و تومورهای حساس به پروژسترون در پستان و تخمدان و بیماری کبدی و غیره به پزشک معالج اطلاع داده شود. عوارض جانبی شامل تهوع و استفراغ، اختلالات خلقی می باشد. قبل و بعد از استفاده دستها شسته شده و از هر اپلیکاتور فقط یکبار استفاده شود.	نکات آموزشی



راهنمای مصرف داروهای بخش زایمان

نام دارو : انسولین	
نام های تجاری : هومولین	
شکل دارو	قلمی-ویال
اثر دارو	درمان دیابت بارداری
نکات آموزشی	علائم تشخیصی دیابت بارداری شامل تاری دید، خستگی، تشنگی زیاد، دفع ادرار بیشتر، تهوع، کم شدن وزن و عفونت می باشد. تزریق انسولین به صورت زیر جلدی در ران، باسن یا بازو می باشد. در صورت بروز عوارضی چون تورم و خارش محل تزریق، تنگی نفس، سرگیجه، تعریق و ضعف با پزشک متخصص مشورت گردد. برای آگاهی از شرایط نگهداری دارو حتما بروشور دارو مطالعه شود.