



## راهنمای مصرف داروهای بخش دیالیز

|  |   |
|--|---|
| <b>نام دارو: اریتروپویتین ( erythropoietin )</b><br><b>نام های تجاری: EPOLYREC-OSVEPOIETIN- Cinnapoietin</b> |   |
| شکل دارو   | 4000 IU/2000 IU/1000 IU آمپول   |
| اثر دارو   | محرك توليد گلبول قرمز-درمان كم خونی   |
| نكات آموزشی  | محلول دارو را <b>تكان ندهید</b> . در صورت تغيير رنگ از مصرف خودداری کنید. در <b>مجاورت نور و منبع گرمایی قرار ندهید</b> . جهت انتقال به منزل یا بیمارستان با <b>یخ حمل کنید</b> و نیم ساعت قبل از مصرف در دمای اتاق باشد. |



## راهنمای مصرف داروهای بخش دیالیز

|  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>نام دارو: ونوفر ( VENOFER )</b><br><b>نام های تجاری: ALBOFER-Ferinject</b>  |                 |                    |
| آمیول 60mg-100 mg  | <b>شکل دارو</b> |                    |
| درمان کمبود آهن  | <b>اثر دارو</b> |                    |
| نیاز به نگهداری در یخچال ندارد. با مصرف این دارو ممکن است دچار افت فشارخون، درد قفسه سینه، راش پوستی و خس خس سینه شوید. حتما باید در مراکز درمانی تزریق شود. به دلیل احتمال بروز عوارض جانبی مذکور باید از تزریق وریدی سریع خودداری شود. |                 | <b>نکات آموزشی</b> |



## راهنمای مصرف داروهای بخش دیالیز

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>نام دارو : اسید فولیک ( Folic acid )</b>   |                 |
| <b>نام های تجاری : ففورکسی - بست فولات</b>  |                 |
| قرص 5mg   | <b>شکل دارو</b> |
| تولید کلبول قرمز  | <b>اثر دارو</b> |
| در برخی از افراد ممکن است باعث عوارض تنفسی و گرگرفتگی علایم پوستی و بی قراری شود. در صورت بروز به پزشک مراجعه کنید. |                 |
| <b>نکات آموزشی</b>  |                 |



## راهنمای مصرف داروهای بخش دیالیز

نام دارو: **کربنات کلسیم ( Calcium carbonate )**

نام های تجاری: **کلسیماکس**

|   |                 |
|---|-----------------|
| قرص 500mg   | <b>شکل دارو</b> |
| درمان کمبود کلسیم   | <b>اثر دارو</b> |
| این دارو باید <b>یک ساعت بعد از غذا</b> مصرف شود. <b>اگر باهدف اصلاح فسفر باشد، در وسط غذا میل کنید.</b> با مصرف این دارو ممکن است دچار تهوع، یبوست، استفراغ، خشکی دهان و تشنگی شوید. از مصرف همزمان با سایر مکمل های حاوی املاح معدنی خودداری شود. |                 |
| <b>نکات آموزشی</b>  |                 |



## راهنمای مصرف داروهای بخش دیالیز

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>نام دارو : کلسی تریول</b>  |                    |
| <b>نام های تجاری : رو کالترول</b>   |                    |
| mcg0/25 کپسول   | <b>شکل دارو</b>    |
| درمان کاهش سطح کلسیم خون  | <b>اثر دارو</b>    |
| دارو را همراه با غذا یا با معده خالی مصرف کنید. در صورت وجود مشکلات گوارشی همراه غذا مصرف شود. اگر دچار افزایش سطح فسفر خون هستید از این دارو استفاده نکنید. از مصرف همزمان داروهای ضد اسید حاوی منیزیم با این دارو خودداری کنید. | <b>نکات آموزشی</b> |



## راهنمای مصرف داروهای بخش دیالیز

نام دارو: **سولامر**

نام های تجاری: **رنازل-رنولا**

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| قرص 400 و 800mg   |  | <b>شکل دارو</b>    |
| درمان افزایش فسفات خون  |  | <b>اثر دارو</b>    |
| همراه غذا مصرف کنید و قرص بطور کامل بلعیده شود. اگر فراموش کردید رنازل مصرف کنید دوز فراموش شده حذف و در زمان بعدی خود همراه با غذا میل مصرف شود و از 2 برابر کردن دارو خودداری کنید. بصورت دوره ای آزمایشات pt/ptt چک شود. |  | <b>نکات آموزشی</b> |



## راهنمای مصرف داروهای بخش دیالیز

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>نام دارو: ویتامین C</b><br><b>Ascorbic acid</b><br><b>نام های تجاری :-</b>   |                    |
| آمپول 5 سی سی و قرص جوشان<br>500,1000mg   | <b>شکل دارو</b>    |
| پیشگیری و درمان کمبود ویتامین C   | <b>اثر دارو</b>    |
| آمپول را در معرض آفتاب قرار ندهید. قرص اگر همراه غذا مصرف شود جذب بهتری خواهد داشت. با مصرف این دارو ممکن است دچار تهوع، استفراغ، اسهال، سردرد و دل درد شوید. | <b>نکات آموزشی</b> |



## راهنمای مصرف داروهای بخش دیالیز

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>نام دارو: نفروویت</b><br><b>nephrovit</b>   |                 |
| <b>نام های تجاری: نفرهیل</b>   |                 |
| قرص روکشدار  | <b>شکل دارو</b> |
| مکمل غذایی در نارسایی مزمن کلیه  | <b>اثر دارو</b> |
| اگر وعده غذایی شما حاوی لبنیات است یا قرص آهن مصرف می کنید بهتر است برای پیشگیری از کم شدن جذب قرص نفروویت را در وعده ی دیگری مصرف کنید. مصرف این مکمل همزمان با دیالیز سبب دفع آن از بدن می شود و بهتر است بعد از دیالیز مصرف شود . |                 |
| <b>نکات آموزشی</b>   |                 |





## راهنمای مصرف داروهای بخش دیالیز

|   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>نام دارو : سیناکلست</b><br><b>cinacalcet</b><br><b>نام های تجاری : sensipar</b>  |                 |                    |
| قرص 60 و 30mg   | <b>شکل دارو</b> |                    |
| کاهش مقدار هورمون پاراتورمون<br>و کاهش ذخایر اضافی کلسیم و فسفر   | <b>اثر دارو</b> |                    |
| بهبتر است همراه با غذا یا اندکی پس از غذا مصرف کنید. قرص را باید کامل ببلعید و <b>از خورد کردن آن خودداری کنید</b> . در صورت کلسیم پایین تر از حد نرمال مصرف نشود و در صورت بروز علائمی مثل گرفتگی و درد عضلات، بی حسی اندام ها و تشنج به پزشک مراجعه کنید. |                 | <b>نکات آموزشی</b> |



## راهنمای مصرف داروهای بخش دیالیز

**نام دارو: هپارین**

heparin

**نام های تجاری: هیالودیک**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>نام دارو: هپارین</b><br>heparin<br><b>نام های تجاری: هیالودیک</b>                             |                    |
| آمپول 5000   | <b>شکل دارو</b>    |
| ضد انعقاد رقیق کننده خون   | <b>اثر دارو</b>    |
| انجام پروسیجرهای دندانپزشکی و هر نوع عمل جراحی به روز غیر دیالیز موکول و به پزشک اطلاع داده شود. | <b>نکات آموزشی</b> |



## راهنمای مصرف داروهای بخش دیالیز

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>نام دارو: والسارتان</b><br>valsartan  |                    |
| <b>نام های تجاری: والزومیکس</b>  |                    |
| قرص 40-80-160mg  | <b>شکل دارو</b>    |
| درمان فشارخون بالا و نارسایی قلبی  | <b>اثر دارو</b>    |
| همراه با یا بدون غذا طبق دستور پزشک <b>در ساعت مشخصی از روز</b> دارو را مصرف کنید. در طول درمان با این دارو از ماندن زیاد در هوای گرم، تغییر وضعیت ناگهانی و دوش آب داغ اجتناب کنید. از عوارض مصرف این دارو سردرد، سرگیجه، گیجی، احساس سبکی سر تنگی نفس تازی دید می باشد. <b>در طول مصرف این دارو نبض و فشار خون خود را بطور مرتب چک کنید.</b> | <b>نکات آموزشی</b> |



## راهنمای مصرف داروهای بخش دیالیز

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>نام دارو: آمیلودیپین</b><br>amlodipine  |                 |
| <b>نام های تجاری: آمیلوپرس - آمیلوبر</b>   |                 |
| قرص 5mg  | <b>شکل دارو</b> |
| درمان فشار خون بالا  | <b>اثر دارو</b> |
| <b>نکات آموزشی</b><br>با مصرف این دارو تورم پا یا مچ پا شایع است. از عوارض دیگر آن خستگی و خواب آلودگی، گر گرفتگی، تپش قلب، لرزش می باشد این عوارض ظرف چند روز از بین می رود اما اگر ادامه یابد حتما با پزشک مشورت کنید. |                 |