



راهنمای مصرف داروهای بخش داخلی جراحی

نام دارو : استامینوفن

نام های تجاری : paracetamol-Atasol

| | |
|---|--------------------|
| | |
| قرص 325,500 میلی گرم - شیف - شربت | شکل دارو |
| تسکین درد - کاهش دهنده تب - درمان دردهای خفیف و متوسط | اثر دارو |
| ممکن است باعث عوارض خارش، اختلال تنفسی، گیجی شدید، تورم صورت شود. اگر علائم غیرعادی مانند تهوع و استفراغ یا زردی پوست یا چشم را تجربه کردید فوراً به پزشک مراجعه کنید. | نکات آموزشی |



راهنمای مصرف داروهای بخش داخلی جراحی

نام دارو : استیل سیستین

نام های تجاری : N-Acetylcysteine-Mucosol-Airborn

| | |
|--|---------------------------|
| <p>قرص جوشان 600 میلی گرم</p> | <p>شکل دارو</p> |
| <p>خلط آور- آنتی دوت مسمومیت با استامینوفن</p> | <p>اثر دارو</p> |
| <p>مصرف این دارو ممکن است باعث عوارض جانبی از قبیل تهوع و استفراغ و گاهی ممکن است پوست دچار خارش شود. ظرف 2 ساعت پس از آماده سازی مصرف شود.</p> | <p>نکات آموزشی</p> |



راهنمای مصرف داروهای بخش داخلی جراحی

نام دارو : فنوفیرات

نام های تجاری : تریکور

| | |
|---|--------------------|
| کپسول 200 میلی گرم و 100 میلی گرم | شکل دارو |
| کاهنده (لیپید) چربی خون | اثر دارو |
| کپسول نباید باز، جویده یا حل شود. بهترین زمان مصرف دارو صبح می باشد. با معده پر مصرف گردد. در صورت داشتن درد عضلانی به پزشک معالج اطلاع داده شود. بدن درد و یبوست از عوارض احتمالی مصرف این دارو می باشد. | نکات آموزشی |



راهنمای مصرف داروهای بخش داخلی جراحی

نام دارو: جم فیبروزیل

نام های تجاری: Lopid-ge-fibro-APO-Gemfibrozil

| | |
|---|--------------------|
| قرص 300 و 450 میلی گرم | شکل دارو |
| کاهش دهنده چربی خون | اثر دارو |
| نیم ساعت قبل از غذا مصرف شود. انجام آزمایشات کبدی و شمارش سلول های خونی هر شش ماه برای مصرف کنندگان این دارو توصیه میشود. | نکات آموزشی |



راهنمای مصرف داروهای بخش داخلی جراحی

نام دارو: **امکا 3**

نام های تجاری: -

قرص 1000 میلی گرم

شکل دارو

پیشگیری از بیماری های قلبی و سرطان و آلزایمر

اثر دارو

بهترین زمان مصرف میل کردن همراه با یکی از وعده های غذایی چرب است تا جذب آن به حداکثر برسد.

نکات آموزشی

در صورت هرگونه تغییر در ضربان قلب خود پزشک را از آن مطلع سازید.



راهنمای مصرف داروهای بخش داخلی جراحی

| نام دارو: آپیکسابان | نام های تجاری: Eliquis |
|---------------------|---|
| شکل دارو | 5 و 2/5 میلی گرم |
| اثر دارو | ضدانعقاد خون، کاربرد در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی بدون تعویض در چه |
| نکات آموزشی | <p>بهبتر است با معده پر و بعد از غذا مصرف شود.</p> <p>در صورت داشتن هرگونه جراحی پزشک خود را از مصرف این دارو مطلع نمایید.</p> <p>در صورت هرگونه خونریزی جدی و طولانی مدت نیاز به اقدام فوری دارید.</p> <p>در صورتیکه بیمار قادر به بلعیدن قرص نیستید یک قرص را در 60 سی سی آب یا آبمیوه سیب حل نموده و بلافاصله میل نمایید.</p> <p>دوزهای مساوی و بالاتر از 15 میلی گرم با غذا مصرف شود.</p> |



راهنمای مصرف داروهای بخش داخلی جراحی

| نام دارو : ریواروکسابان | | نام های تجاری : زارتو - Xarleto |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| شکل دارو | 10 و 15 و 20 میلی گرم | |
| اثر دارو | ضد لخته های خونی | |
| نکات آموزشی | استفاده از غذاهای سبک برای جلوگیری از مشکلات گوارشی به صورت وعده های کوچک توصیه میشود. برای جلوگیری از هرگونه خونریزی و جراحات در هنگام استفاده از ناخن گیر و تیغ احتیاطات لازم صورت گیرد. | |



راهنمای مصرف داروهای بخش داخلی جراحی

نام دارو: نفروویت

نام های تجاری: نتراهیل

| | |
|---|--------------------|
| قرص 100 میلی گرمی | شکل دارو |
| مولتی ویتامین برای بیماران کلیوی و دیالیزی | اثر دارو |
| در بیماران دیالیزی پس از انجام دیالیز مصرف گردد. این دارو با داروهای زینک، کلسیم و آهن تداخل دارد. مصرف این دارو با فراورده های لبنی همزمان نباشد. | نکات آموزشی |



راهنمای مصرف داروهای بخش داخلی جراحی

نام دارو: لووتیروکسین

نام های تجاری: لووکسین-لوونین

| | |
|--|--------------------|
| قرص 50 و 100 میکروگرم | شکل دارو |
| درمان کم کاری تیروئید | اثر دارو |
| از قطع خوسرانه دارو خودداری شود. به صورت ناشتا و قبل از صبحانه مصرف گردد. در وعده صبحانه از مصرف گردو، سویا، گریپ فروت و نوشیدنی کافئین دار اجتناب گردد. | نکات آموزشی |



راهنمای مصرف داروهای بخش داخلی جراحی

نام دارو: والپرات سدیم

نام های تجاری: دپاکین-والپاکین-رهاکین

| | |
|---|--------------------|
| قرص 500 و 200 میلی گرم | شکل دارو |
| ضدتشنج-ضدصرع-درمان میگرن | اثر دارو |
| همراه با غذا و آب فراوان مصرف گردد. اگر یک دوز از دارو فراموش گردد، دارو در اسرع وقت مصرف گردد. در صورتیکه قصد فرزندآوری دارید (هم آقا هم خانم)، به پزشک اطلاع دهید. در بارداری منع مصرف دارد. | نکات آموزشی |



راهنمای مصرف داروهای بخش داخلی جراحی

نام دارو : کلی کلزید

نام های تجاری : گلیکوور- کلی زیتکس

30 و 60 و 80 میلی گرم

شکل دارو

کاهنده قندخون

اثر دارو

نکات آموزشی

برای جلوگیری از افت شدید قندخون همراه با غذا مصرف شود.
بعلت احتمال افت قند به همراه مصرف این دارو، بهتر است همیشه آب نبات یا چند حبه قند با خود داشته باشید.



راهنمای مصرف داروهای بخش داخلی جراحی

نام دارو : تامسولوسین

نام های تجاری : فلو مگس- آولوسین- تامسوور

قرص 0/4 میلی گرم

شکل دارو

جهت درمان هایپرپلازی پروستات و بیماران دارای سنگ کلیه

اثر دارو

بعد از غذا مصرف شود.

نکات آموزشی

در صورت داشتن جراحی آب مروارید چشم، پزشک معالج را از مصرف آن باخبر سازید.

در بیماران فشارخونی با ترازوسین منع مصرف دارد.



راهنمای مصرف داروهای بخش داخلی جراحی

نام دارو: کلستریول

نام های تجاری: روکاترول

| | |
|--|--------------------|
| کپسول 0/25 میلی گرم- آمپول کلسی تریول بی اچ 1 میکروگرم/ میلی لیتر | شکل دارو |
| درمان کاهش سطح کلسیم خون | اثر دارو |
| دارو را همراه با غذا یا با معده خالی مصرف کنید. اگر دچار افزایش سطح فسفر خون هستید، از این دارو استفاده نکنید. از مصرف همزمان داروهای ضد اسید حاوی منیزیم با این دارو خودداری کنید. در صورت وجود مشکلات گوارشی با غذا مصرف شود. | نکات آموزشی |



راهنمای مصرف داروهای بخش داخلی جراحی

نام دارو: **متفورمین**

نام های تجاری: **گلوکوفیک-متفورنکس-گلوکوفاز**

| | |
|-------------|--|
| شکل دارو | قرص 500، 1000 میلی گرم |
| اثر دارو | درمان بیماران دیابتی نوع دو |
| نکات آموزشی | همراه با غذا مصرف شود. در صورت داشتن هر گونه علائم شامل تهوع، استفراغ، ناراحتی معده و اسهال به پزشک خود اطلاع دهید. در صورت داشتن واکنش آلرژیک شامل تب، علائم پوستی، تورم غدد لنفاوی سریعاً پزشک خود را مطلع سازید. قرص هایی که روی آن ER نوشته شده نباید جویده یا شکسته شود. |



راهنمای مصرف داروهای بخش داخلی جراحی

نام دارو : اناکسویارین

نام های تجاری : سلکسان-lovenox

| | |
|--|--------------------|
| آپول 4000 و 6000 واحد | شکل دارو |
| جهت پیشگیری از لخته شدن خون | اثر دارو |
| بررسی هرگونه خونریزی داخلی یا خارجی و کبودی پوست و واکنش های پوستی در محل تزریق. از تزریق دارو در فاصله کمتر از 5 سانتی متر از ناف خودداری کنید. در صورت انجام هرگونه اقدام جراحی، پزشک خود را از مصرف این دارو مطلع سازید. | نکات آموزشی |



راهنمای مصرف داروهای بخش داخلی جراحی

نام دارو: آزیترومایسین

نام های تجاری: AZISTRA-ZIMEXIR-زیتوسیدال

| | |
|--|--------------------|
| قرص و کپسول 250 و 500 میلی گرم - سوسپانسیون خوراکی | شکل دارو |
| درمان برخی از عفونت های باکتریایی | اثر دارو |
| کپسول آزیترومایسین بهتر است با معده خالی یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا مصرف شود ولی در صورت درد معده می توان آن را با غذا مصرف کرد. در هنگام مصرف مایعات به مقدار کافی مصرف شود. | نکات آموزشی |



راهنمای مصرف داروهای بخش داخلی جراحی

نام دارو : پنتوپرازول

نام های تجاری : Pantosec- پنتومید - Pantoflex—Nolpazza

| | |
|---|--------------------|
| 20 و 40 میلی گرمی خوراکی و تزریقی موجود است | شکل دارو |
| کاهش تولید اسید معده | اثر دارو |
| بهبود پنتوپرازول را صبح حدود 30 دقیقه قبل از غذا مصرف نمایید. عوارض جانبی احتمالی می تواند شامل سردرد، حالت تهوع، اسهال و درد معده باشد. | نکات آموزشی |



راهنمای مصرف داروهای بخش داخلی جراحی

نام دارو: سلکوکسیب

نام های تجاری: Celebrex-CEBEX

| | |
|---|--------------------|
| کپسول 100 و 200 و 400 میلی گرمی | شکل دارو |
| داروی ضدالتهابی غیراستروئیدی است که به کاهش التهاب و درد بدن کمک می کند | اثر دارو |
| بهتر است همراه غذا مصرف شود و برخی از عوارض نسبتاً شایع عبارتند از: سرفه، تب، عطسه، بثورات پوستی، گلودرد، تورم صورت و انگشتان و پاها و ساق پا | نکات آموزشی |

